

COLONOSCOPY

تناول أدويةك العادية

إذا كنت تتناول أي أدوية عادية (يومية أو أسبوعية)، يجب أن تعرف كيفية تناولها في اليوم المقرر لتنظير القولون واليوم السابق. فيما يلي المبادئ الإرشادية فقط - أما الأسئلة المحددة أكثر فيمكن التعامل معها من قبل طبيبك أو مزود الرعاية الصحية الخاص بك. اسأل طبيبك قبل أسبوع على الأقل من الفحص إذا كانت لديك أية أسئلة.

- أدويةك العادية: يمكنك تناول معظم الأدوية في الأوقات العادية التي تتناولها فيها. يجب أن تستمر في تناول جميع أدويةك العادية بعد تنظير القولون.
- أدوية السكري: يتطلب الأمر في أغلب الأحيان تغيير هذه الأدوية في الوقت المقرر لتنظير القولون. يرجى الإطلاع على إرشادات مرضى السكري الذين يحضرون لتنظير القولون.
- (Voltaren® أو Arthrotec®) الأدوية المضادة للالتهابات التي تستخدم غالبًا لتسكين الألم أو حالات الالتهاب (مثل دواء ديكلوفيناك لا مانع - Vimovo® أو Naprosyn® أو Anaprox® أو Aleve®) أو دواء نابروكسين، (Motrin® أو Advil®) أو دواء ايبوبروفين عادةً من الاستمرار في تناول هذه الأدوية.
- استمر في تناول هذا الدواء كالمعتاد (مثل Tylenol®): أسيتامينوفين
- استمر في تناول هذا الدواء كالمعتاد (ASA أو) أسبرين
- عادة ما يتم الاستمرار في تناول هذه الأدوية بالنسبة لبعض الإجراءات الخاصة (Brilinta) تيكاجريلور، (Plavix®: مثل) كلويدوجريل (على سبيل المثال إزالة السلائل الكبيرة (التي تتم أثناء تنظير القولون، قد يطلب منك طبيب التنظير الخاص بك التوقف عن تناول هذه الأدوية قبل 5 إلى 7 أيام من الوقت المقرر لتنظير القولون. سوف تستمر في تناول هذه الأدوية بعد الفحص
- أو رايفاروكسابان، (Pradaxa®) أو دابيجاتران، (Eliquis®) أو أبكسابان (Coumadin®) مضادات تجلط الدم مثل وارفارين. يرجى مراجعة طبيبك حول كيفية تناولها: (Xarelto)
- أدوية ضغط الدم: تأكد من الاستمرار في تناول هذه الأدوية أثناء التحضير للفحص. في اليوم المقرر للفحص، تناول هذه الأدوية مع الماء قبل ساعتين على الأقل من الفحص.
- الأدوية العادية للنوم أو القلق: يمكن تناولها كالمعتاد
- توقف عن تناول الأدوية التي تحتوي على الحديد، مثل فومارات الحديد الثنائي أو جلوكونات الحديد الثنائي أو سلفات الحديد الثنائي أو الأدوية متعددة الفيتامينات مع الحديد. قبل أسبوع من الوقت المقرر لإجراء تنظير القولون تناولها بعد الإجراء.