

COLONOSCOPY

服用常规药物

如果您服用任何常规药物（每天或每周服用），您应该了解在结肠镜检查当天和前一天如何服药。以下仅为指南--更多具体问题可由您的医生或医护人员解答。如果您有任何问题，应在检查前至少一周咨询您的医生。

- 您的常规药物：您可以在常规服药时间服用大多数药物。结肠镜检查后，您应继续服用所有常规药物。
- 糖尿病药物：结肠镜检查前后通常需要改变这类药物的使用。请参见对糖尿病患者准备结肠镜检查的指南。
- 消炎药（通常用于治疗疼痛或炎症），例如双氯芬酸（如Arthrotec®、Voltaren®）、布洛芬（如Advil®、Motrin®）、或萘普生（如Aleve®、Anaprox®、Naprosyn®、Vimovo®），通常可以继续服用。
- 对乙酰氨基酚（如Tylenol®）：像平常一样继续服用。
- 阿司匹林（或ASA）：像平常一样继续服用。
- 氯吡格雷（如Plavix®）、替卡格雷（Brilinta）：通常这类药物可继续服用。如果在结肠镜检查过程中进行某些特别手术（例如较大息肉切除），您的结肠镜检查医生可能要求您在检查前5-7天停止服用这些药物。检查后您将继续服用这些药物。
- 血液稀释剂，例如华法林（如Coumadin®）、阿哌沙班（Eliquis®）、达比加群（Pradaxa®）或利伐沙班（Xarelto）：请咨询医生如何服用这些药物。
- 控制血压药物：准备检查时请务必继续服用这些药物。检查当天，在检查之前至少2小时用水送服这些药物。
- 治疗睡眠问题或焦虑的常规药物：可以像往常一样服用。
- 含铁药物，例如富马酸铁、葡萄糖酸铁、硫酸亚铁，含铁的多种维生素。在检查之前一周停止服用这些药物。检查后恢复服用。

请登录mycolonoscopy.ca了解更多有关结肠镜检查的详情。

Optimizing colonoscopy, Harminder Singh和John R. Walker著, 2017, University of Manitoba, Canada
符合Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License的许可。
在不对该材料进行任何改动（没有演绎）的情况下您可以复印和分发全部材料。

