

COLONOSCOPIA

Cómo tomar sus medicamentos habituales

Si toma medicamentos habituales (diaria o semanalmente), debe saber cómo tomarlos el día de la colonoscopia y el día anterior. Lo siguiente son pautas solamente. Su médico o proveedor de atención de la salud puede contestar preguntas más específicas. Si tiene preguntas, hable con su médico al menos una semana antes del examen.

- Sus medicinas habituales: Puede tomar la mayoría de las medicinas en las horas en que usualmente las toma. Después de la colonoscopia, debería continuar con todas sus medicinas habituales.
- Medicamento antidiabético: El uso de estos medicamentos con frecuencia debe modificarse antes y después de la colonoscopia. Consulte las instrucciones para pacientes diabéticos que se preparan para una colonoscopia.
- Medicina antiinflamatoria (con frecuencia usada para condiciones de dolor o inflamación), como diclofenaco (p. ej. Arthrotec®, Voltaren®), ibuprofeno (p. ej., Advil®, Motrin®), o naproxeno (p.ej., Aleve®, Anaprox®, Naprosyn®, Vimovo®). Usualmente no hay problemas si sigue tomando estas medicinas.
- Acetaminofeno (p. ej., Tylenol®): Continúe tomando esto como acostumbra.
- Aspirina (o ASA): Continúe tomando esto como acostumbra.
- Clopidogrel (p. ej. Plavix®), ticagrelor (Brilinta): Usualmente estos medicamentos se siguen tomando. Para ciertos procedimientos especiales (por ejemplo, la extracción de un pólipo grande) efectuados durante la colonoscopia, su médico podría pedirle que deje de tomar estas medicinas de 5 a 7 días antes de la colonoscopia. Seguirá tomando estas medicinas después del examen.
- Anticoagulantes como warfarina (p. ej., Coumadin®), apixabán (Eliquis®), dabigatrán (Pradaxa®) o rivaroxabán (Xarelto): Consulte con su médico acerca de cómo tomarlos.
- Medicinas para la presión arterial: Asegúrese de seguir usando estos medicamentos mientras se prepara para el examen. El día del examen, tómese estos medicamentos con agua al menos 2 horas antes del examen.
- Medicinas habituales para el sueño o la ansiedad: Pueden seguirse tomando como de costumbre.
- Medicamentos con hierro, como fumarato ferroso, gluconato ferroso, sulfato ferroso, multivitaminas con hierro. Deje de tomar estas una semana antes del procedimiento. Reanude la gestión de estas posteriormente.

